



Fongicide à large spectre d'action en forme de "SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)"

CARACTERISTIQUES :

LEMBAR est un fongicide qui contient deux substances actives de différents modes d'action:

- Tébuconazole est un fongicide systémique qui agit, à l'intérieur des tissus végétaux, sur le développement des champignons.
- Chlorothalonil est un fongicide de contact multi-site préventif de large spectre d'action et de longue persistance qui agit à l'extérieur des tissus végétaux sur les spores des champignons en germination de plusieurs cultures (cucurbitacées, céréales, légumineuses et autres...).

MODES D'ACTION:

Tébuconazole

La substance active Tébuconazole agit sur la déméthylation de la synthèse des stérols (DMI), avec une action préventive et curative, indiquée pour le contrôle de différentes maladies fongiques.

Après son application, le tébuconazole pénètre rapidement à travers les feuilles et les jeunes tissus végétaux. Puis il migre lentement et régulièrement vers l'intérieur de la feuille.

est acropétale ascendante, à travers le système vasculaire de la plante. Il a également la possibilité de la diffusion latérale. Le processus d'absorption est favorisé par des températures chaudes à doux et diminue aux températures basses. Le tébuconazole possède une très bonne efficacité contre les maladies visées.

Chlorothalonil

Le Chlorothalonil appartient à la famille chimique des chloronitriles. C'est un fongicide de contact multi-site qui perturbe diverses enzymes importantes des champignons en empêchant leur germination.

A ce jour, nous ne connaissons aucune résistance au Chlorothalonil. Il est utilisé dans les programmes de lutte anti-résistance ou associé à d'autres fongicides.

CONDITIONS D'EMPLOI:

- Traiter de préférence sur une végétation sèche.
- Ne pas appliquer le produit **Lembar** si une pluie est prévue dans les deux heures.
- Ne pas traiter par temps très variable et très ensoleillé.
- L'ajout d'un agent mouillant non ionique favorise la pénétration du produit dans les tissus végétaux.
- Le produit **Lembar** est compatible avec les fongicides et les insecticides les plus courants, à l'exception de la réaction fortement alcaline.

TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Ravageurs	Doses
Légumineuses	Anthraxnose	300-350cc/hl
Pomme de terre		
Tomate	Mildiou	
Melon		
vigne	Mildiou-Botrytis	
Oignon	Botrytis	
Ail	Rouille	3 L/ha
Blé	Fusariose - Septoriose	

Appliquer le produit dès que les premiers symptômes apparaissent.

Un délai avant récolte minimum de 3 jours

* Fongicide systémique et de contact à action préventive, curative et éradiquante.

* Activité de contact multisite du chlorothalonil.

* Protection complète.

* Limitation des risques d'apparition de résistances.



Société El Khadra

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001

Fax: (216) 73 447 999

E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn





Lembar®

لمبار

Tébuconazole 60g/l + Chlorothalonil 166g/l SC

الخصائص:

لمبار مبيد فطري متكون من مادتين مختلفتين الفاعلية التبيكونزول وهو مبيد فطري جهازي ينشط أساسا داخل الأنسجة النباتية حيث يمنع تطور المرض الفطري ، الكلوروثالونيل وهو مبيد فطري بالملامسة وقائي طويل الأمد يعمل خارج الانسجة ويمنع تطور وإنبات أبواغ العديد من الفطريات التي تصيب الكثير من النباتات مثل القرعيات، الحبوب، البقوليات والكثير من الزراعات الأخرى.

الاستعمال والجرعة:

الجرعة	الأفات	المحصول
300 - 350 مل/هـ	انتراكناوز	البقوليات
	الميلديو	البطاطا
		الطماطم
	الميلديو - التعفن الرمادي	البطيخ
	التعفن الرمادي	العنب
	الصدأ	البصل
3 ل/هـ	فيزاريوم - التبقع السببوري	الثوم
		القمح

احتياطات الاستعمال:

لا يجب مزج المبيد لمبار مع التركيبات القلوية و الزيوت
احترام فاصل زمني لا يقل عن 3 أسابيع بين استعمال لمبار و المبيدات الزيتية
تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العينين
يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات أثناء الرش
تجنب استنشاق رذاذ الرش وابتلاع المسحوق
يمنع التدخين و الأكل و الشرب عند استعمال المبيد
يجب حفظ المبيد في عبوته الأصلية في مكان مغلق و جاف و موهوا و بعيدا
عن المأكولات و الأعلاف و بعيدا عن تناول الأطفال
يجب تغيير الملابس و الاغتسال عند الانتهاء من الرش

الإسعافات الأولية:

في حالة تناوله عن طريق الفم، يرجى الاتصال بالطبيب فوراً و عدم تناول أي شيء عن طريق الفم
إبقاء المريض على الراحة التامة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة
إذا فقد المصاب الوعي، الإبقاء عليه على أحد جانبيه مع خفض رأسه في
مستوى أقل من الجسم و أن تكون الركبتين شبه مثنيتين
مراقبة التنفس و اللجوء إلى التنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر
نقل المريض إلى مركز علاجي و عدم ترك المصاب وحده في حال من الأحوال
في حالة ملامسة المبيد للجلد و العينين، يتم غسلهم بكمية كبيرة من الماء
خلع الملابس الملوثة بعد استعمال المبيد
في حالة استنشاق رذاذ المبيد أو مسحوقه، الذهاب إلى مكان مفتوح و جيد التهوية

شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001
الفاكس: (216) 73 447 999
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn

