

PESTICIDES



Insecticide

# PROXIMO®

Pyriproxifène 100 Gr/l EC



## INSECTICIDE DE CONTACT AVEC ACTION TRANSLAMINAIRE



### DESCRIPTION :

**PROXIMO** est un insecticide à base de 100Gr/L de la substance active **Pyriproxifène** qui appartient à la famille chimique Dérivés de Pyridines.

**Pyriproxifène** est un insecticide du Groupe 7 (IRAC) nommé « Régulateur de Croissance » agit par contact et ingestion sur tous les stades de vie des insectes, notamment les œufs et les larves.

**PROXIMO** est un insecticide qui agit en imitant l'hormone juvénile en allongeant les immatures (larves) et il perturbe la métamorphose et stérilise les œufs.

**PROXIMO** pénètre dans les tissus végétaux par mouvement translaminaire, ce qui assure la protection des deux côtés de la feuille même si le dessous n'est pas pulvérisé et ne se transfère pas dans la plante.

**PROXIMO** se caractérise par une action lente et une persistance élevée dans les feuilles (pas de résistance).



### TABLEAU D'USAGE :

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION:

Cultures	Parasites	Doses	Nombre d'application	D.A.R (Jour)
Tomate - Piment Aubergine	Mouche Blanche	75cc/100L	2	3
Fruitiers à noyaux et pépins	Pou de San José	50cc/100L	1	-
Agrumes	Toutes type de Cochenilles	50cc/100L	1	30

•**Tomate, Piment et aubergine:** Appliquer par pulvérisation foliaire pendant les premiers stades larvaires des insectes à contrôler, de préférence les premières générations. Réaliser jusqu'à 2 applications par campagne.

•**Agrumes:** Appliquer par pulvérisation foliaire pendant les premiers stades larvaires des insectes à contrôler, de préférence les premières générations (Mois Mai et Juin). Effectuer un seul traitement en préfloraison sans dépasser 0,5L/ha.

•**Fruitiers à noyaux et à pépins:** Appliquer par pulvérisation foliaire pendant les premiers stades larvaires des insectes à contrôler, de préférence dès la première génération. Effectuer un seul traitement en préfloraison sans dépasser 0,5L/ha.

•**Traitement d'hiver :** Appliquer par pulvérisation foliaire associer avec l'huile blanche et le cuivre métal.



### PRECAUTIONS D'EMPLOI :



### PREMIERS SECOURS :

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas respirer les vapeurs du produit.
- Ne pas manger, boire ou fumer durant l'utilisation de ce produit
- Éviter le contact avec la peau et les yeux
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
- En cas d'ingestion ne pas faire vomir. **EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN (montrer l'étiquette si possible)**

Retirer la personne de l'aire contaminée. Enlever immédiatement les vêtements souillés. Laver les yeux avec abondamment d'eau pendant au moins 15 minutes. Laver la peau avec abondamment d'eau et du savon sans frotter. Ne rien administrer par voie orale. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Maintenir le patient au repos. Conserver la température corporelle. Si la personne est inconsciente, la coucher sur le côté avec la tête plus basse que le reste du corps et les genoux semi-fléchis. Contrôle de la expiration. Pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. Transporter la personne intoxiquée à un hôpital et montrer l'étiquette ou le récipient si possible.

### NE PAS LAISSER LA VICTIME SEULE EN AUCUN CAS

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES POUR LES PERSONNES ET L'ENVIRONNEMENT, SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

NE PAS CONTAMINER L'EAU AVEC LE PRODUIT OU LE RÉCIPIENT (Ne pas nettoyer l'équipement d'application du produit près des eaux superficielles. Éviter la contamination par les systèmes d'évacuation d'eaux des fermes ou des chemins).

**Société El Khadra**

Av. Taieb M'hiri 5000 Monastir  
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001  
Fax: (216) 73 447 999  
E-mail: ste.khadra@topnet.tn  
site web: www.elkhadra.tn





# بروكسيمو

بيريبروكسيغان 100 غ/ل EC

الخصايات :

بروكسيمو مبيد حشري مكون من 100 غ/ل من المادة الفعالة بيريبروكسيغان التي تنتمي الى العائلة الكيمائية مشتقات البيريدين. بيريبروكسيغان هي مبيد حشري يسمى "منظم لنمو الحشرات"، يعمل عن طريق اللمس والابتلاع في جميع مراحل نمو الحشرات خاصة على اليرقات و البيض. بروكسيمو مبيد حشري يعمل على تغيير نسق نمو اليرقات في المراحل الاولى لتكوينها و يعطل تحول اليرقات الى شرانق وهو يمنع الحصول على حشرة كاملة النمو وفي نفس الوقت يعقم البيض. بروكسيمو يخترق الانسجة النباتية (الأوراق) عن طريق التسرب تحت غلاف الأوراق الشفاف من الاعلى و من الاسفل بدون الولوج الى داخل النبتة و الاختلاط مع النسغ. بروكسيمو يختص بفاعليته البطيئة و دوامه داخل النبات (الأوراق).

الاستعمال و الجرعة :

المحصول	الأفات	الجرعة	فترة الأمان
طماطم - الفلفل - الباذنجان	الذبابة البيضاء	75 مل/هـل	3 أيام
الأشجار المثمرة	بو دى سان جوسيه	50 مل/هـل	-
الحمضيات	الحشرات القشرية	50 مل/هـل	30 يوم

احتياطات الاستعمال :

حفظ المبيد بعيدا عن متناول الأطفال .  
يجب حفظ المبيد في عبوته الأصلية في مكان مغلق و جاف و موهوا و بعيد عن المأكولات و أعلاف الحيوانات .  
تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق.  
يمنع التدخين و الأكل و الشرب عند استعمال المبيد.  
تجنب ملامسة المبيد للجلد أو للعين.  
يجب ارتداء ملابس واقية وقفزات أثناء الرش.  
يجب تغيير الملابس و الاغتسال عند الانتهاء من الرش.

الإسعافات الأولية :

في حالة تناوله عن طريق الفم، يرجى الاتصال بالطبيب فوراً و عدم تناول أي شيء عن طريق الفم. إبقاء المريض على الراحة التامة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة. إذا فقد المصاب الوعي، الإبقاء عليه على أحد جانبيه مع خفض رأسه في مستوى أقل من الجسم و أن تكون الركبتيين شبه مثبتيين .  
مراقبة التنفس و اللجوء الى التنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر.  
نقل المريض الى مركز علاجي و عدم ترك المصاب وحده في حال من الأحوال.  
في حالة ملامسة المبيد للجلد و العينين، يتم غسلهم بكمية كبيرة من الماء.  
خلع الملابس الملوثة بعد استعمال المبيد.  
في حالة استنشاق رذاذ المبيد أو مسحوقه، الذهاب الى مكان مفتوح و جيد التهوية.



توصيات للاستخدام :

- الطماطم - الفلفل و الباذنجان: يرش الدواء على الأوراق في المراحل الأولى للبرقة يستحسن المداواة منذ الأجيال الأولى. يمكن تطبيقه مرتين طيلة الموسم .
- القوارص: يرش على الأوراق منذ بداية ظهور الأجيال الأولى للحشرة (اليرقات) خاصة في شهر ماي و جوان . يستعمل الدواء مرة واحدة قبل الأزهار دون تجاوز 0.5/ل هـك .
- أشجار مثمرة: يرش على الأوراق منذ بداية ظهور الأجيال الأولى للحشرة (اليرقات) و يستعمل الدواء مرة واحدة قبل الإزهار دون تجاوز 0.5/ل هـك .
- المداواة الشتوية: يرش هذا الدواء على الأوراق مع إضافة الزيت الأبيض (المعدني) ومادة النحاس.



شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير

الهاتف: 28 418 001 - 73 462 925

الفاكس: 73 447 999 (216)

E-mail: ste.khadra@topnet.tn

site web: www.elkhadra.tn