

Fongicides

CURYGEN®



CARACTERISTIQUES:

Difenoconazole 250 g/l EC

CURYGEN EC est un fongicide à base de la substance active Difénoconazole (250 gr/l) sous forme de concentré émulsionnable (EC), **CURYGEN EC** est un fongicide systémique en lutte préventive et curative doté d'une large spectre d'efficacité contre les maladies telque l' Oïdium, Black rot de la vigne, Alternariose de la pomme de terre, de la tomate, de l'asperge et de la laitue, Moniliose des fruitiers à noyaux et de la Tavelure des fruitiers à pépin (pommier, poirier....).

CURYGEN EC est rapidement diffusé dans les parties aériennes des plantes par son action pénétrant translaminaire (il traverse la partie supérieure de la feuille à la partie inférieure) et par systémie ascendante.

Il bloque le développement du mycélium dans les tissus végétaux.

TABLEAU D'USAGE:

Cultures	Maladies	Dose	DAR (j)
Vignes	Oïdium, Black rot et Rougeot parasitaire	20cc/hl	14
Fruitiers à pépins	Tavelure - Oïdium	20cc/hl	7
Fruitiers à noyaux	Moniliose - Oïdium	20cc/hl	14
Solanacées	Alternariose	40cc/hl	3
Cucurbitacés	Oïdium	40cc/hl	7
Oignions - Ails	Rouilles	40cc/hl	7
Rosiers	Alternariose	50cc/hl	7

▶ PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux.
- Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection
- Ne pas manger, boire ou fumer.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un local fermé, frais et aéré, loin des aliments y compris ceux pour animaux et hors de la portée des enfants.
- Changer de vêtements et se laver le visage et les mains après application et avant de mange.
- En cas d'accident appler rapidement le médecin et lui montrer l'étiquette ou le contenant si possible.

Recommandations:

Curygen EC doit être appliqué dès que les conditions sont favorables au développement de la maladie ou dès l'apparition des premiers

symptômes.

EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN (MONTRER L'ÉTIQUETTE SI POSSIBLE.

Société El Khadra Av. Taieb M'hiri 5000 Monastir Fax: (216) 73 447 999 E-mail: ste.khadra@topnet.tn site web: www.elkhadra.tn

PESTICIDES

Fongicides





CURYGEN®

Difenoconazole 250 g/l EC

الخاصيات:

كيريجين مبيد فطري يتكون من 250غ/ل من المادة الفعالة ديفينوكونازول في شكل مستحلب مركز، كيريجين هو مبيد فطري جهازي يعمل وقائيا وعلاجيا لمكافحة الامراض الفطرية و خاصة البياض الدقيقي.

كيريجين سريع الامتصاص عن طريق الأوراق ويمنع بشكل كبير تطور الفطريات في الأنسجة النباتية ويمنع ظهور الأعراض.

الاستعمال والجرعة:



الجرعة	الأفات	المحصول
20 مل/هل	البياض الدقيقي - العفن الاسود	الكروم
20 مل/هل	الجرب - البياض الدقيقي	التفاحيات
20 مل/هل	المونوليوز- البياض الدقيقي	الأشجار المثمرة
40 مل/هل	الترنريوز	الباذنجانيات
40 مل/هل	البياض الدقيقي	القرعيات
40 مل/هل	الصدأ	البصل - الثوم
50 مل/هل	الترنريوز	الورد

✓ احتياطات الاستعمال:

- تجنبوا ملامسة المبيد للجلد والعينين.
- عدم استنشاق رذاذ الرش وابتلاع المسحوق.
- ارتداء قفازات ونظارات حماية أثناء استخدام المبيد.
- عدم تناول الطعام أو الشر اب أو التدخين أثناء استخدام المبيد.
- الاحتفاظ بالمبيد داخل عبوته الأصلية في مكان مغلق يتم تهويته ويكون بعيدا عن الأطعمة بما في ذلك أطعمة الحيوانات وبعيدا عن متناول الأطفال.
- تغيير الملابس وغسل الوجه والأيدي بعد استخدامه وقبل تناول الطعام.
- في حالة الحوادث، الاتصال بالطبيب وعرض بطاقة المبيد أو عبوته إذا أمكن.

الاسعافات الاولية:

- في حالة تناوله عن طريق الفم، يرجى الاتصال بالطبيب فوراً وعدم تناول أي شئ.
- يجب حصول المريض على الراحة التامة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة.
- إذا فقد الشخص الوعي، الإبقاء عليه على أحد جانبيه مع خفض رأسه في مستوى
 أقل من الجسم وأن تكون الركبتين شبه مثنية.
 - مراقبة التنفس واللجوء إلى التنفس الصناعي إذا لزم الأمر.
- يجب نقل المريض إلى مركز علاجي وعدم ترك المريض وحده في أي حال من الأحوال .
- في حالة ملامسة المبيد للجاد والعينين، يتم غسلهم بكمية كبيرة من الماء خلع الملابس الماوثة.
 - في حالة الاستنشاق، الذهاب إلى مكان مفتوح جيد التهوية.

شــركة الخضــراء

ئيار ع الطيب المهبري5000 المنستير لهاتف: 28 418 001 28 - 73 462 الفاكس: 299 73 447 و216) E-mail: ste.khadra@topnet.tn

