

PESTICIDES



Herbicide Sélectif Anti Graminées

FOUIR®

FLUAZIFOP-P-BUTYL 150G/L EC

DESCRIPTION :

Fourir est un herbicide sélectif de post-levée est composé de la substance active **Fluazifop-p-butyl 150g/l EC** pour lutter contre les graminées annuelles et vivaces dans plusieurs cultures notamment la betterave à sucre, Pois chiche, Fève, Féverole, Petit pois, Artichaut, Ail, Asperge, Céleri, Cornichon, Chicorée, Choux, Epinard, Laitue, Fruitières... Le **Fluazifop-P-butyl** est une substance active forte et est absorbé par le feuillage des graminées et en moindre proportion par les racinaires. Après sa pénétration se transforme très vite en Fluazifop acide qui migre rapidement avec les courants de sève ascendante et descendante pour exercer son action sur les zones en croissance active des graminées (méristèmes).

MODE D'ACTION :

FOUIR agit uniquement sur les graminées. Il pénètre dans la plante, et il est transporté par les courants de sève ascendante et descendante dans tout le végétal. L'arrêt de croissance intervient contre 1 à 2 jours après l'application et les symptômes apparaissent dans les 8 jours (jaunissement puis rougissement ou brunissement et dépérissement). La plante meurt au bout de 3 semaines. Le chiendent est mieux détruit si, avant l'établissement de la culture, on sectionne les rhizomes par un travail mécanique.

TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Ravageurs	Doses	Dar
P.chiche, Fève Féverole	adventices graminées, ray grass non résistant (en post levée)	1.25L/Ha (250cc/Hl)	-
Pomme de terre	Graminées annuelles et vivaces	1.25L/Ha (250cc/Hl)	42 jours
Artichaut	Graminées annuelles et vivaces	1.25 l/Ha pour les annuelles et 2.5l/Ha pour les vivaces	30 jours
Asperge	Graminées annuelles et vivaces	1.25 l/Ha pour les annuelles et 2.5l/Ha pour les vivaces	42 jours
Ail, Oignon	Graminées annuelles et vivaces	1.25 l/Ha pour les annuelles et 2.5l/Ha pour les vivaces	28 jours
Navets, Betterave	Graminées annuelles et vivaces	1.25L/Ha (250-350cc/Hl)	42 jours
Céleri, Chou, Persil Epinard, Laitue	Graminées annuelles et vivaces	1.25 l/Ha pour les annuelles et 2.5l/Ha pour les vivaces	42 jours
Vignes	Graminées annuelles et vivaces	1.70L/Ha (250-350cc/Hl)	28 jours
Oliviers	Graminées annuelles et vivaces	1.75L/Ha (250-350cc/Hl)	21 jours
Fruitières Agrumes	Graminées annuelles et vivaces	1.70L/Ha (250-350cc/Hl)	21 jours



PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- *Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux.
- *Ne pas avaler, et ne pas respirer les poussières.
- *Porter des vêtements des gants et des lunettes de protection pendant le traitement.
- *Ne pas manger, ni boire ou fumer pendant le traitement.
- *Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un local fermé, frais et aéré, loin des aliments y compris ceux pour animaux et hors de la portée des enfants.
- *Changer de vêtements et laver le visage et les mains après application et avant de manger.
- *En cas de accident appeler rapidement le médecin et montrer l'étiquette ou le contenant si possible.

PREMIERS SECOURS :

- *En cas de l'ingestion, appeler rapidement le médecin. N'administrez rien par une voie orale. Maintenez le patient dans un repos. Conserver la température corporelle. Contrôler la respiration, pratique la respiration artificielle si nécessaire.
- *En cas de contact avec la peau et les yeux rincer abondamment à l'eau propre. Enlever les vêtements souillés.
- *En cas d'inhalation, se placer dans un endroit frais et bien aéré.
- *Transporter la victime à un Centre Hospitalier. NE PAS LAISSER LA VICTIME SEULE EN AUCUN CAS.

Société El Khadra

Av. Taieb M'hiri 5000 Monastir
 Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001
 Fax: (216) 73 447 999
 site web: www.elkhadra.tn
 E-mail: ste.khadra@topnet.tn



Sharda CropChem

Herbicide Sélectif Anti Graminées

Elkhadra

FOUIR®

FLUAZIFOP-P-BUTYL 150G/L EC

الخصائص :

فوير مبيد عشبي إنتقائي متكون من المادة الفعالة فلوزيفوب - ب - بتيل 150 غ/ل ، على شكل مستحلب مركز لمدواة الأعشاب الطفيلية ذات الفلقة الواحدة في العديد من الزراعات وخاصة الحمص ، الفول ، الجلبانة ، الثوم ، الكلافس ، اللفت السكري...
فلوزيفوب - ب - بتيل هو مادة فعالة سريعة الامتصاص عن طريق الاوراق و بدرجة اقل من الجذور. بعد امتصاصها يتم تحويل المادة الفعالة بسرعة كبيرة الى حمض فلوزيفوب الذي يتنقل بسرعة مع تيارات تصاعديا و تنازليا لممارسة عملها على المناطق سريعة النمو من الاعشاب (Méristèmes). عن طريق منع (Enzyme accase).

الإستعمال و الجرعة:

الإسعافات الأولية:

المحصول	الافات	الجرعة	فترة ما قبل الجني
الحمص و الفول	الأعشاب ذو الفلقة الواحدة الحولية والمعمرة	1.25 ل/هك	-
البطاطا	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.25 ل/هك	42 يوم
الخرشوف	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.25 / 2.5 ل/هك	30 يوم
السكوم	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.25 / 2.5 ل/هك	42 يوم
الثوم ، البصل	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.25 / 2.5 ل/هك	28 يوم
الكلافس ، الكرنب ، البقدونس السبناخ و الخس	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.25 / 2.5 ل/هك	42 يوم 42-28 يوم
الأشجار المثمرة والقوارص	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.70 ل/هك	21 يوم
العنب	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.70 ل/هك	28 يوم
الزيتاين	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.75 ل/هك	21 يوم
اللفت و اللفت السكري	الأعشاب الحولية والمعمرة	1.25 ل/هك	42 يوم

احتياطات الاستعمال :

- تجنبوا ملامسة المبيد للجلد والعينين.
- عدم استنشاق رذاذ الرش وابتلاع المسحوق.
- ارتداء قفازات ونظارات حماية أثناء استخدام المبيد.
- عدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء استخدام المبيد.
- الاحتفاظ بالمبيد داخل عبوته الأصلية في مكان مغلق يتم تهويته ويكون بعيدا عن الأطعمة بما في ذلك أطعمة الحيوانات وبعيدا عن متناول الأطفال.
- تغيير الملابس وغسل الوجه والأيدي بعد استخدامه وقبل تناول الطعام.
- في حالة الحوادث، الاتصال بالطبيب و عرض بطاقة المبيد أو عبوته إذا أمكن.

شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001
الفاكس: 73 447 999 (216)
site web: www.elkhadra.tn
E-mail: ste.khadra@topnet.tn