



# Micene Triple<sup>®</sup>

Benalaxyl 6% + Cymoxanil 3.2% + Mancozèbe 40% WP



## → CARACTERISTIQUES :

**MICENE TRIPLE** est un fongicide à base de trois substances actives et trois mode d'action différents systémique pour le **Bénalaxyl**, pénétrant pour le **Cymoxanil** et de contact pour le **Mancozèbe**, il peut être utilisé en préventive, et en curative.

## → MODE D'ACTION :

**MICENE TRIPLE** est un fongicide multi-site ayant trois modes d'action:

\***Le Bénalaxyl**: appartient à la famille chimique des phénylamides. La matière active est systémique et pénètre rapidement dans les tissus végétaux. Il est distribué en grande partie par la sève dans toute la plante. Le Bénalaxyl empêche la germination des spores, détruit la formation des tubes germinatifs, détruit les myceliums déjà présents dans les tissus et empêche la sporulation.

\***Le Cymoxanil**: Contact, préventif, curatif, de post-infection et éradiquant, agissant par pénétration et ayant une action translaminare. Efficace sur la famille des péronosporacées, il contrôle les attaques de Mildiou.  
\* En détruisant le champignon à la surface des feuilles au moment de la germination.  
\* Détruire sélectivement le mycélium pendant sa période d'incubation.  
\* Maladie visible : limite la formation de conidies et réduire le pouvoir germinatif.

**Le Mancozèbe**: appartient à la famille chimique des dithiocarbamates. C'est un fongicide de contact « multi-site ». Il inhibe la germination des spores. Son efficacité est indépendante de la température. Aucune résistance n'est encore connue avec l'utilisation du Mancozèbe.

➔ **L'association de trois matières actives assurent une efficacité sûre et de longue durée pour lutter contre le mildiou et l'alternariose des plusieurs cultures.**

Cultures	Maladies	Doses	DAR
Concombre	Mildiou de cuba	300 Gr/HI	7
Melon, Pastèque	Mildiou et Alternaria	300 Gr/HI	7
Pomme de terre	Mildiou et Alternaria	300 Gr/HI	30
Tomate	Mildiou et Alternaria	300 Gr/HI	3
Vigne	Mildiou	300 Gr/HI	30

## → TABLEAU D'USAGE :

## → PRECAUTION :

Mouiller bien et uniformément la plante, surtout la face inférieure des feuilles, les grappes, les branches et les bouquets.

## → AVERTISSEMENT :

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.)

La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.





# ميسان تريبل®

بيناكسيل 6% + سيمفنزيل 3,2% + منكوزاب 40%

## الخصائص :

ميسان تريبل مبيد فطري يتكون من ثلاث مواد فعالة ذو فاعليه مختلفة حيث يمتاز البيناكسيل بخاصيته الجهازية و السيموفنزيل بخاصيته النافذة و المنكوزاب بالملامسه. يمكن استعمال ميسان تريبل وقائيا و علاجيا. ميسان تريبل يقضي على الامراض الفطرية و خاصة مرض الميلديو عن طريق: بيनाكسيل: ينتمي الى العائلة الكيمايائية Phénylamides ، وهي ماده جهازية سريعة الامتصاص و سريعة الانتشار في كل اجهزة النبتة مما يمنع تكون الفطريات في كل مراحلها و يقضي على اي من اشكالها الموجودة. السيموفنزيل: بلامسة كل اجزاء النبتة يحول دون انتشار المرض في جميع مراحلها من تكون الابواغ الى انتشار الفطر . سيموفنزيل يعطى للمبيد خاصية وقائية علاجية و حتى انه يوفر نوع من الحماية بعد توقف المرض. المنكوزاب: ينتمي الى عائلة Dithiocarbamates و يتميز بخاصية الملامسة واسعة الاهداف حيث انه يستهدف عدد كبير من اشكال الفطريات و في مختلف الزراعات. كما انه لا يتاثر بدرجات الحرارة و لم يسجل له اي شكل من اشكال المقاومة.

تتضمن هذه المواد الثلاث يضي على المبيد خصائص مقاومة ناجعة و على المدى الطويل للعديد من الامراض الفطرية و خاصة الميلديو و الالتراريو .

## الاستعمال و الجرعة :

الزراعة	الآفة	الجرعة	فترة ما قبل الجني
الفقوس	ميلديو كوبا	300 غ/هـل	7
البطيخ والدلاع	ميلديو	300 غ/هـل	7
البطاطا	ميلديو	300 غ/هـل	30
الطماطم	ميلديو	300 غ/هـل	3
العنب	ميلديو	300 غ/هـل	30

## احتياطات الاستعمال :

تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين. يجب ارتداء ملابس واقية و قفازات اثناء الرش. تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق. يمنع التدخين و الاكل و الشرب عند استعمال المبيد. يجب حفظ المبيد في عبوته الاصلية في مكان مغلق و جاف و مهواء و بعيدا عن المأكولات و الأعلاف و بعيدا عن متناول الأطفال. يجب تغيير الملابس و الإغتسال عند الانتهاء من الرش.

## الإسعافات الأولية:

في حالة تناول المبيد عن طريق الفم او استنشاقه يجب الاتصال مباشرة بالطبيب. في حالة إصابة العين و تلوث الجلد يغسل جيدا بكمية كبيرة من الماء النظيف. عند الاستنشاق يحمل المصاب الي الهواء الطلق و استدعاء الطبيب في حالة صعوبة التنفس.



## شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير  
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001  
الفاكس: 73 447 999 (216)  
E-mail: ste.khadra@topnet.tn  
site web: www.elkhadra.tn