

PESTICIDES




Insecticide

FOSLETE 50[®]

Phosmet 50% WP





→ DESCRIPTION :



FOSELETE 50 WP est un insecticide organophosphoré à base du phosmet pour le contrôle d'un grand nombre de ravageurs sur plusieurs cultures : Cochenilles des agrumes, Cochenilles de l'olivier, Cochenilles des arbres fruitiers, Psylles du poirier, pommier et figuier, Cératite pour toutes arbre fruitiers, Thrips des agrumes et autres Thysanoptères, Tordeuses des agrumes, Tordeuse de vigne, Mineuses des feuilles, Carpocapses du pommier et poirier, Mouche de l'olivier.

→ TABLEAU D'USAGE :

Culture	Ravageurs	Doses	DAR
Poirier	Carpocapse	100 g/hl	30 jours
Arbres fruitiers	Carpocapse, teigne, vers de jeunes fruits, psylle	100 g/hl	30 jours
Pêcher	Cératite	150 g/hl	14 jours
Agrume	Cératite	100 g /hl	28 jours



→ MODE D'ACTION :

FOSELETE 50 WP agit par contact, ingestion et inhalation sur plusieurs ravageurs dont il inhibe la cholinestérase. Il est absorbé par les feuilles mais non véhiculé par la sève. Son action est extrêmement rapide sur certains insectes piqueurs et broyeurs (carpocapse, Psylles..). **FOSELETE 50 WP** est un insecticide sélectif de nombreux auxiliaires.

→ CONSEILS D'UTILISATION :

- * Bien mouiller l'ensemble de la végétation, Effectuer des applications préventives régulières suivant les avis des stations d'avertissement agricoles.
- * Porter un vêtement de protection et des gants approprié pendant la phase d'application pendant la phase mélange / chargement.
- * Protéger les organismes aquatiques.



SIPCAM
IN AGRA

Société El Khadra

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001
Fax: (216) 73 447 999
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn

Insecticide

PESTICIDES



فوزلات 50®

فوزمات 50% WP

← الخصائص:

فوزلات 50 مبيد حشري على شكل مسحوق قابل للبلل مكون من 50% من المادة الفعالة فوزمات التي تنتمي إلى العائلة الكيميائية أوركثوفوسفوري. فوزلات 50 يمنع الإستيل كولين استراز كما هو فعال على اليرقات القشرية المن و ذبابة الفواكه و القرديات التي تصيب الأشجار المثمرة و الكروم.

← الاستعمال و الجرعة:

الزراعات	الافات	الجرعات	فترة ما قبل الجني
الاجاص	الكربوكابس	100 غ/هل	30 يوما
الأشجار المثمرة	الكربوكابس، العثة، دودة الفواكه، البسيل	100 غ/هل	30 يوما
الخوخ	ذبابة الفواكه	150 غ/هل	4 ايوم
الحمضيات	ذبابة الفواكه	100 غ/هل	28 يوم

← الإسعافات الأولية:

في حالة تناول المبيد عن طريق الفم أو استنشاقه يجب الاتصال مباشرة بالطبيب. في حالة إصابة العين و تلوث الجلد يغسل جيدا بكمية كبيرة من الماء النظيف. عند الاستنشاق يحمل المصاب الي الهواء الطلق و استدعاء الطبيب في حالة صعوبة التنفس.

← احتياطات الاستعمال :

تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين. يجب ارتداء ملابس واقية و قفازات اثناء الرش. تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق. يمنع التدخين و الاكل و الشرب عند استعمال المبيد. يجب حفظ المبيد في عبوته الاصلية في مكان مغلق وجيد التهوية و بعيدا عن المأكولات و الأعلاف و بعيدا عن تناول الأطفال. يجب تغيير الملابس و الإغتسال عند الانتهاء من الرش.

شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير

الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001

الفاكس: 73 447 999 (216)

E-mail: ste.khadra@topnet.tn

site web: www.elkhadra.tn

SIPCAM
INAGRA